

中兽医治疗脱肛的手术疗法

吉林农业大学兽医系中兽医研究室

家畜脱肛多见于猪，马次之，牛较少见。我校兽医院过去对于此病采用西兽医的手术疗法，操作复杂，对后期疾病治疗尤感困难。自成立中兽医研究室后，根据有的同志以往临床治愈患畜百余头的经验，乃采用中兽医的手术疗法。几年来共治疗十例（猪六例、马二例、骡驹各一例）一般一次痊愈。因此我们认为采用中兽医手术治疗脱肛，方法简便，效果确实，尚无不良后果，故特介绍，以供参考。

原因：根据元亨疗马集记载：“夫脱肛者，脏头脱出也。皆因力败羸马，劳伤瘦马，或负重而上高坡，或夜臥仰于凹处，为因努力，以致脱肛头弩出，风吹瘀膜，冷硬难收”。近代兽医学认为，肛門括约肌纤弱和直腸周圍結締組織弛緩，加以腹压增加，为脱肛之原因，与元亨疗马集所阐述者基本相同。

症状：患畜直腸粘膜脱出肛門外，初如拳大，久之淤膜（粘膜）肿胀，逐渐增为饭碗大，乃至小盆大。色泽颇似西红柿。脱出部分被尾毛及粪便污染，并有血块附着，后期部分淤膜呈现坏死。患畜不时努責揭尾，弓腰草細。

手术疗法：大家畜須保定在六柱栏內，中小家畜則行橫臥保定，然后施术。施术时选用0.1%过锰酸钾液洗滌脱出的部分，然后术者用手指将淤膜层捏破，自破处流出稀薄紅黄色的无臭液体。坏死部分亦需同样捏碎。待整个浮腫处，完全捏碎，甚至捏成乱絲状时，大量排出渗出液，再用剪子謹慎地将捏碎的淤膜及坏死膜剪去，但不要剪得太深，以免造成穿孔。随捏随剪，脱出部分随之愈来愈小，直到坏死部分捏淨为止，大約剩下有大西红柿大以后，用手将脱出部分輕輕送入肛門內即告整复。术后不必再絕食，可按平常飼喂，休息3—4天即可使役。

注意事项：

- 1、本手术所指的脱肛系指直腸粘膜脱出，不包括直腸脱。
- 2、施术前須使家畜絕食一頓，以免腹压增高，給手术带来困难。
- 3、施术时应小心謹慎，只可剪去捏碎的淤膜和坏死部分，不可損伤深层組織，对仔猪更要注意。

小结：

- 1、采用中兽医手术疗法治疗家畜脱肛，操作簡便，确实有效，不需特殊的器材藥品，一般在20—30分鐘內即可整复。
- 2、通过10例的手术疗法，尚无不良后果。