

# 养猪能手谈养猪

## 农安县万顺人民公社饲养员李凤玉的养猪经验

农安县万顺人民公社平山管理区姜东窝堡生产队养猪场的饲养员李凤玉同志，是一个会饲养、会配种、会接产、会治疗、会防疫的全能饲养员。1958—1959年先后被选为县、市、省的先进生产者。生产队养猪场1958年初仅有猪105头，到1959年末已发展到283头，比1958年增长1.7倍，小猪成活率达96.4%，全队每人平均养一头猪。农安县委为了推动全县的养猪工作，于1960年2月由县委书记亲自带领李凤玉同志在全县17个人民公社巡回演讲，介绍养猪先进经验，3月份又在长春地区各市县，吉林省农业科学院及吉林农业大学等单位作了详尽的养猪经验介绍，深受广大群众的热烈欢迎。现在我们将李凤玉的养猪经验，加以整理，介绍于后，供大家参考。

### 怎样养好公母猪

喂猪的时候做到“三净”：一是饲料里的土筛净；土要不筛净，猪吃了土就要拉稀。二是把工具洗净，喂猪的多样工具，隔一个月就用碱水和小灰水洗二遍，或者用水煮一下。三是猪圈槽净，圈槽使完后就刷，一天刷三遍。在喂猪的时候，随手就捎带一桶水来，舀一杓子水从槽子这边浇过去，再从那边浇回来，这样一冲圈槽就干净了。圈槽作法是槽子的矮帮5寸高，高帮1尺高，高帮要带折页，喂完后盖上盖。槽帮高容易往里倒食，不会倒在猪脑袋上，盖上盖就能防止灰土和病菌侵入，也防止别的猪跑来乱哄。

养猪还要做到六定，六定能保证把猪养好：一定饲养员（专职），不随便叫人乱喂；二定饲料，按猪的大小规定饲料量；三定头数，多少头数心中有数；四定防疫，定好防疫制度预防传染病；五定粪肥，一头猪大小平均一年要积攒一万五千斤粪，六

定工具，喂猪工具一人一套，防止乱抓。

喂猪的时候，应该“看槽添，喊槽喂”，“少给勤添，猪必吃的欢”，“频添少掐，猪必吃的好”，“猪要吃的欢，饲养员就欢着添”，但是一定要定食定量，一口大母猪一次能吃一桶食。

每吃完料后，撒点香料（炒过的向日葵壳粉）打扫槽底，这时候一拍巴掌猪就走了，跑到大坑里去拉屎撒尿。

在喂料前，要“冬摸凉热夏摸草”，冬天天冷食水太热，容易烫猪咀，若看到猪咀巴子往槽子里一插，马上就抬起头，到处乱跑，这说明食水太热了。在夏天青饲料中常带硬梗，应把硬梗挑出来，不然猪不嚼就嚥下去，不但不易消化，并促使患胃肠病。虽然每吨还能吃点食，但日子一久，就要瘦死饿死。猪死了后解剖开还找不出病，就是在肠子里有个“草蛋”。因此，我认为：“猪吃长草，多嚼不能好”，“猪吃百样草，必须弄碎了”。

喂猪还要做到四好：这就是说，叫猪“吃的好，吃的饱，一天三遍食，必须往前找，晚间入猪洞，必须毛晒好，最好屎尿安排好”。什么叫吃的好呢？就是饲料要多种多样，干稀混合均匀，不细不喂，不熟不喂，这样就能叫猪吃的好。吃的饱就是把猪的犬窝（臀部）喂起来，特别是改良种猪自来犬窝就是圆的，若是看犬窝没起来就是没吃饱。一天要喂三遍食，早食在太阳还没出来就喂完，晌午十一点喂午食，晚上在太阳尚未下山前就喂。

每天晚上喂完料后，让猪毛都干了，猪盘（猪炕）的草要干燥，屎尿都拉完了再放进猪窝。晚上喂食后，若不讓猪把屎尿在外边拉掉，夜里就要拉在猪炕上。在晚上十点多钟饲养员抓把苞米粒往里一撒，猪起来吃苞米粒，也就把粪尿都拉出来了，到鸡叫的时候，再抓一把土块一撒，猪以为是撒苞米就出来吃，因此又起来拉屎撒尿，一夜哄起来两遍，

保証不能尿窩子。尿窩子最不好，潮濕容易得病。

猪炕必須墊高，猪洞要長，使风吹不进去，炕要短。俗語說：“長洞短盤(猪炕)必然不尿盤。”就是这个意思。猪圈里每天要清扫一遍，將干草往上扫，尿要打掃淨，扫完用小灰撒一遍。每一个月用白灰和来苏儿进行大消毒兩次。

猪粪不在圈里瀘，把粪倒在外边坑里，撒上土攪粪。克郎猪和肥猪在大圈里瀘粪。

对公猪一定要細心飼养，它和母猪不一样，它的体格壯，精子就旺盛。公猪必須單圈养，千万不能圈在一起，圈在一起公猪也爬公猪，也能射精消耗公猪精力，時間長了公猪就要弓腰变成了瘦猪。公猪的圈要离母猪圈远一些。公猪天天一定要运动。夏天放牧的时候，不要公猪母猪在一块放，以免消耗公猪精力。常常运动和放牧的公猪精子就强壯。公猪的飼料里不能缺少鹽，喂鹽就去火，不发生便秘。若是公猪撒黄尿就是上火了。夏天天热公猪一天要洗个澡，一天給兩遍水喝，防止口渴。

## 飼料的种类、性質、加工、調制 和喂飼的方法

能喂猪的飼料很多，象谷秕糊，糜秕糊，高粱壳、豆叶、豆毛、蕎麦花、大喀头(向日葵头)、大喀秕子、大喀花、苞米瓢子等。在青飼料中有甜菜叶子、胡蘿卜英子、老蒼子、灰菜、苋菜、馬齿菜、車轆糖菜、土豆秧、瓜秧、青麻叶等等很多，足有几十样。

各种各样的飼料都有不同的性質。谷秕糊、糜秕糊、高粱壳、苞米瓢这些飼料粗纖維多，不易消化，都容易使猪发生便秘。小馬駒拉稀的时候，用苞米瓢子燒糊粉碎拌白糶喂給小馬駒，就能制止下痢。因此它是把干的止瀉的。蕎麦花、甜菜叶子、胡蘿卜英子、瓜秧等这些青飼料都属于下瀉性，象蕎麦花是凉性的，下瀉，因此，把它归在下瀉性飼料里。豆毛、麻籽格蕘、高粱芒糠这些飼料都属于中性，多喂点，少喂点不出毛病。

各种飼料怎样調制。象高粱壳子可分出兩样，上边是壳子，下边是芒糠。高粱壳經篩过土后喂猪猪粪发粘，最好是把它用磨磨碎用鍋糊。豆毛子除去土后，直接就可以倒在鍋里糊，糊好的豆毛喂猪，猪粪能起“油皮”油性很大。谷秕糊和糜秕糊必須加工后才能用，把它放在炕上炕，但是不能用鍋炒，因为炒后秕糊变苦，猪不爱吃。上炕炕好后上碾子压，压碎后再喂。苞米瓢子在打完場后鋪在場

院用碾子压，然后再收起来倒在炕上炕，炕干后，放在碾子上磨碎，把里边的大硬粒都篩出去不要，剩下的細面用来喂猪最好。在苞米棒子尖上应留点小粒，尖上不用太压，用鍋煮过后拌食里很粘稠，黄色，很香。豆毛用谷篩子篩一遍，下鍋煮前一定把土篩淨。煮好直接喂猪。麻籽格蕘最好用碾子压，再用谷篩子把土篩淨，拌食的时候，少加一点就可以了。因为它是油料作物，营养很丰富。母猪在产崽的时候，用麻籽格蕘喂母猪，能起催奶作用。在仔猪将要断乳的时候，喂紅粘谷糠和糜糠这两样飼料能减少母猪的泌乳量。大喀头炕干后，用碾子压，再用谷篩子篩，篩出細面再和别的飼料掺合一起很粘稠。有人說：喂大喀头好掉崽子(流产)。这是因为喂法不当，喂的太多了，少喂点就好了。大喀秕子、花子、叶子等用鍋炒或用碾子压，再用篩子篩，別讓碎皮漏下去。这种飼料不能把它放在鍋里糊，可炒成香料，打掃槽底用，少加点炒好的香料，打掃槽底猪吃的快，大喀花有下瀉作用。猪粪干燥时，往飼料里拌点大喀花子就能通便道，它还有甜味和蜂蜜味，猪很爱吃。

若想养好猪光把飼料調制好还不行，一定还要天天看猪吃完料后拉出来的粪成什么样子。若是猪沒有火，但是排粪还很困难，屎拉下来后，尿不变样，就是說喂干性飼料多了，这样就把“把干”的飼料撒一点，加点下瀉性的飼料就一定好。若是拉出来的屎太稀，不成块，就是稀性飼料太多了，干飼料少了。猪要拉出的粪又不干，又不稀，有粘性，这才相当。

## 母猪催情和配种的方法

我們生产队养的猪，一开始是一粒粮食也沒有，天天喂碎秕糊，当时猪膘特別不好，我曾仔細观察，发现胖猪吃的快，瘦猪吃的慢，小猪根本就不上槽，怎么办呢？我想多喂些青草一定好，因此，第二天我和老侯头两个人天天上山割草，凡是不苦、不辣、不扎咀的草都收割。我們这样天天割草还是不够喂，青草不够喂的时候，就补喂甜菜叶子，就这样天天用青草喂猪了，估計一个多月，把猪就喂到5—6成膘了，毛管很光滑，肚子也大了，但是，母猪都不发情。

在这个时候，我考虑“保証七成膘，年产三窝羔”，母猪太瘦是营养不足，不能怀崽。当时就有人說：猪不发情也是有的，过去喂母猪很濃的甜

水，还有很多糠，现在天天竟喂青草它能发情吗？但我想，喂粮食是长肉长油，一斤肉里能有七两油，母猪太肥不能怀崽，在过去烧锅店（旧社会的酒场）里养的大母猪个个都很肥，有的不发情，也有的发情不怀崽，有的怀崽一窝就产2—3个仔猪。我过去常听老人说，“肥猪油大化精子”，不容易受胎。过去我家养的母猪从来没有特别肥的猪。别人说猪不喂粮食就不能上膘，我们的母猪就没喂粮食也上膘了。“草膘、料劲、水精神”，这就是说有草吃，猪也能上膘。但是现在我们养的母猪一天比一天上膘了，可是还是不发情。当时我想，母猪不发情，可用公马来试情，母猪不发情也得用公猪来试情，当时老侯头反对这个意见，我主张试看，成功与否还得实践一下。

第二天到坑里（当地的地名）和饲养员说要借他们的公猪用用。饲养员说：“你们母猪怎么会发情？我们十九头母猪还一个也没有发情呢！”我说：“有发情的可能，是你没有看见。”他说：“那能呢？公猪和母猪每天在一块喂怎能看不见呢？”我又说：“你们的母猪不发情是因为公猪常在一块儿，把公猪的精力消耗太多了，失去了公猪性欲，因此不能配种。别说公母猪不能圈在一起，就是两个公猪也不能圈在一个圈，公猪在一个圈圈两个也是会互相爬的，也会射出精子来，对公猪的身体很有害。”我和饲养员说完后就把公猪赶回来了。

回到队里，把公猪赶进圈里，有人说，老猪值弄来一头公猪试情，真新鲜。公猪进了圈，小猪崽就往里边跑，“能嚎”（母猪名）这头母猪身体大，进不去站在外边，于是公猪就走到“能嚎”跟前，公猪先闻一闻母猪的阴门，随后就哄母猪的肚皮，随后就往母猪身上爬，母猪就跑了，公猪蹭母猪几个圈，母猪撒了一泡尿，公猪闻一闻后，就不再赶“能嚎”了。于是公猪就蹭别的母猪，弄的一圈老母猪乱跑乱叫。最后我把公猪赶到别的圈里去了。第二天喂完食后，停一会又用这头公猪逗情，一天逗四遍，一直逗到第三天晚上，公猪一进圈，“能嚎”就起来了，它把尾巴摇晃着，耳朵下垂着，跑到公猪跟前，用肩膀抗公猪的肩膀，母猪跟公猪很接近。这回母猪发情就有希望了，看样子还得等一天。到第四天早晨我到猪圈一看，很多母猪都落上落了（母猪互相爬跨），发情的共有八头猪。

母猪不发情用母猪来逗情比公猪还好，母猪发情期食也不爱吃，表现互相爬乘。

猪发情正常情况，是在发情后二十四小时排

卵。开始发情的时候还吃食，以后“就频频排尿，吃食少，乱跑”。母猪不发情时，也可赶着溜和摩擦母猪的阴户，都能促使母猪发情。

母猪发情后，配种要“掐头去尾配当腰”。开始就配不爱怀孕，配晚了卵子也排过去了，即使配上也就能下3—4个崽，这是因为时间没找好。往往有些人，看母猪一发情就要去配，结果公猪不往上爬，到第二天母猪真发情，正是好时候又没有配，第三天可配了，但又过时了，结果没配上，这是错过发情交配适期，造成空腹。

母猪配准，怀了胎，“吃食多，排尿少，一天三遍食，毛管往后倒。”这是母猪妊娠的表现。

母猪的交配方法是今天发情不配，明天晚上配，后天早上配，后天晚上配，一共配三次。配种要在空腹时候配，这个时候配，产仔率高。

配种的时候要把公猪赶到母猪圈里去配，若不，母猪发情排卵后去找公猪，因为交配后母猪的阴门敞着口，母猪乱跑可能就把精子淌出去了。在配种以前先让公猪活动活动，母猪也溜一溜，运动能使身体活软，公母猪在一起运动一些时间，能使公猪母猪性欲高，也能提高产仔率。

配种的方法有很多，为了要叫母猪多下崽，要进行双配，复配和热配。双配就是用两头以上的公猪配，当天早上配两交（指两次），第二天早上再配两交，掐准了时间配四交就好了。有些人认为配的次数较多，就能多下崽，一头母猪一窝下20—30个仔是常有的。复配是用一头公猪配一头母猪，每隔一定时间连续进行几次。热配是在母猪产仔后4—6天配，公猪开始不爱配，因为母猪产后有异味，要用猪尿抹在母猪的阴户和屁股上，公猪就爱上了。有人认为，产后4—6天不发情，但他们相信产后不带猪崽的母猪是发情的。实际上，产后带仔的母猪是因为它舍不得离开猪崽，想崽，所以发情不明显。若是产后4—6天母猪配不上，可把它的猪崽寄养给别的母猪。别的母猪不爱要，可往猪崽身上抹点母猪尿。把大母猪圈在圈里，等一、二天它就发情了。发情配完后，再把它猪崽拿回来，还得抹点这个母猪自己的尿。

## 怎样给猪接产和保护小猪成活

母猪怀孕以后，怎么样管理好确是一个大问题，若是管理不好，养不好还容易发生流产。母猪最怕打腿，打耳朵后部和脑正中间，打了之后一定

要流产。最怕的是油拭布水，这个水里有各种油味，也能引起流产，若是油拭布水和泔水一块喂猪就不要紧，因为泔水缸苦辣酸甜各种味道都有，能中和油拭布的有毒质。母猪怀孕后跳圈以及母猪太瘦，营养不足也都容易流产。到怀孕三个月后，仔猪在胎内长大了，一定要单圈饲养，不然在一起容易发生流产。

母猪在产前，把剪子、产仔箱都要准备齐全，什么时候配的要算清楚，怀孕期一般是115天。母猪快产仔时一定先叼草。但是，不要让母猪在圈内架窝，先把草收起来，用于土面垫好，上边铺上小灰，再铺上格粪，上面再铺上干草。草最好是麦花稽，麦花稽又暖和又光滑，另外糜秧、谷草用镰刀割短些，草太长易将仔猪拌倒，割成5—6寸长才好。母猪叼草架窝（用咀嚼草做窝）先把它赶到圈外，圈外放点草，等它叼完了，再把它赶到窝里，它往草里鑽，因为草短鑽不进去，这样它就爬在草上面了。

母猪在临产前，经过一个时期，发生阵痛，身上发抖，这个时候就快下了，饲养员千万别离开母猪。

小猪生出来后都有牙，对畸型牙要用剪子贴牙根剪去，留着容易咬伤母猪乳头。

小猪出生后先用拭布把猪崽咀擦好，脐带往外撸一撸，留一寸长用线扎好，再用酒精消毒过的剪子剪去，这样不患脐带炎，也不得破伤风。小猪下来就要吃奶，小的吃中间奶头，大的吃后边的，吃那一个奶头要固定好，一定吃那一个，经过1—2天后，就固定好了。为了保护仔猪不使压死，把生下的小猪在头几天吃完奶后，放在产仔箱里，吃奶时拿出来，保证一小时奶一遍，一夜至少要喂4—5遍，不然小猪顶不了。冬天的时候把产仔箱夹成两层，中间一层把烧热的砖放在中间，这就保证在箱里的温度，小猪暖和，不受病，千万不要往很暖的屋里拿，忽冷忽热易患感冒。过了5—6天就不用产仔箱了，小猪很结实，再也压不着它了。母猪产后5—6天就要出产房，搬到猪栋里去，搬家时一定要把原来圈里的草一块儿都搬到猪栋去，因为要另换新草发凉，小猪容易下痢。

若是母猪产死胎，要看看是不是烂了，烂了说明在母猪怀胎的时候受了外界创伤，胎儿停止发育，中途死亡。若是什么毛病也没有就是下生后不会动，即是假死。对假死的小猪，用手扒开它的咀，把粘液都扒出来，手拿着后腿，头朝下，用手拍打

小猪两边肋骨，拍一下就会叫一声，吐一口水，渐渐会活了。

母猪要难产（特别是第一窝的小母猪），饲养员要把手指甲剪光磨秃，洗干净，沾点麻油用一个手指头伸进阴户，把阴户转圈抹点油，一只手托着母猪肚皮，大母猪一使劲，小猪就产下来了。

母猪产崽时，要看胎衣是否出净了，才算完毕，胎衣是白粉色，完全出来后，把它拿到远处挖个坑埋起来，千万不要让母猪吃胎衣，因为吃惯了胎衣，母猪就要吃猪崽。

## 怎样养好小猪

小猪羔生下来后怎么喂呢？上级规定一个小猪10斤粮，怎样吃呢？如撒在地下喂沾泥不干净，在大槽子里喂也易遭损，必须做小猪槽子，槽邦不要太宽太窄，坡度要适当。

小猪开始不会吃食，一定在生后8—9天就教它吃食，先用黄豆用炕烘干，碾碎筛出豆面装在盆里用凉水混稀，加点白糖，在锅里蒸，凉后放在小猪圈里小猪开始去舐一下吹个泡和玩一样，这样慢慢就会吃了。

过了半个月以后小猪就都会吃粮食了，怎么喂呢？喂高粱的时期用茶碗量，按头给量，一窝五个猪崽就给五个的量，八个就给八个的量。小猪崽一天喂四遍，把苞米和高粱都磨成面。饲料的样数要多，特别是加点麻籽更好。小猪早晨喂干食，煮熟以后喂。喂料的时候把大母猪赶出去，把槽子放好，每次喂都是少给，吃多少给多少，以免糟塌饲料。小猪崽喂到27—28天就可以隔奶了，这时候大母猪也没奶了，若不，小猪吃到40—50天，小猪也吃不饱，母猪也上火，母猪肚里怀的胎儿也长不好。要不，一头母猪一年不能下三窝，就是二年下五窝也不可能。刚隔开奶，每天晚上叫母猪回去奶一遍。断奶的时候不能一下就断，开始头一天奶四遍，第二天奶三到四遍，到四五天就断奶了，这样断奶方法，母猪和小猪都不会着病。

隔了奶后大母猪运动2—3天就能发情，发情就能配上种。小猪断奶后要加強饲养，开始一天还要喂四遍，每遍喂稀料。喂的时候小猪分类排队，大的合一圈，中等的和小的也分开，分成三类，每个圈不能超过十个猪崽，小的要多照顾，多补喂一些粮食。饲料都要煮成粥状再喂，每天要把小猪赶到外边运动3—4个小时，上下午各一次，运动

完了后不能馬上就喂飼料，需要休息一些時間。

小豬的豬圈要常常保持干燥，鋪草要干，防止潮湿身上長癩。

## 选 种

选猪种要月月留，年年选，有好的就选。选种要选身腰長的，腿高腿粗的，尾巴尖扁扁的，咀巴短的，两个睾丸要一样大，一大一小或一上一下都不能做种。腿高腿粗的能長大猪。咀巴短，往上翘，鼻孔粗，不闷气，就不易得病，尖咀猪最不好。

母猪也要咀短粗，奶头多，大母猪爱崽子，性好的，不爱压死仔猪，善于扶养仔猪的母猪进圈就呼呼地，把小猪圈在一边，先跪下两只前腿，试探着爬下，这样就不会压死一个小猪。母猪乳房发达，奶头整齐的都應該留做母猪，不善于扶养猪羔的，奶头象油瓶样的，又粗，又扁，奶头数又少都不要留作种猪。

## 防疫卫生和疾病治疗

要想把猪大发展起来，除了以上說的以外，防疫更重要，过去常患猪瘟，所以应特别注意預防打針。每年兽医进行防疫时，我亲自看着，一头也不丢掉。去年我也学会了打針了。自己干更可靠。小豬离奶后应馬上注射防疫針。平常在每次喂完后，用清水把槽子刷干净，盖上盖子防止灰土和别的猪乱哄，帶來病菌，垫草要常換，猪舍用具每月用来苏儿或小灰水消毒兩次，猪圈内外人不能随便进

去。除此外，对几种猪病治疗，我也有几个土办法，介紹如下：

大腸病：猪病不吃食，鼻孔干，尾巴下垂腰弓弓着，好喝冷水，严重时猪排不出粪来。預防的办法是每月喂2—3次大黃末掺芒硝，一个猪每次2—3錢，这就能撤火通便。若严重时，排不出粪，也不吃食，就用半斤麻籽油、半斤面碱，装在玻璃杯內，把猪放在猪食槽里，四条腿朝上，两个人把住，用一根不粗的木棒把嘴撬开，瓶口从嘴角里插进去慢慢倒入口，把瓶拿出来，木棒輕輕敲几下腦門，药就嚥下了，灌完后接着再灌一瓢小米粥，加点鹽和面碱，这样一次就能灌好。

猪下痢：猪下痢主要是飼料調制不当，和飼养管理沒有跟上，可能是猪圈潮湿，或者是猪吃带有冰块的冷食，因此消化不好就下瀉，可以用“貫金片”治疗，七、八十斤的猪，每次灌1—1.5片。或將白矾燒后压碎，和貫金片一起喂下。有条件时也可以用7—8粒胡椒压碎后，混合貫金片，加点黃酒或白酒一齐灌下，效果更好。

小豬抽风：小豬七、八天容易抽风，这主要是沒实行人工接产，脐帶自己断或者是接产不卫生，贼风吹进了，感染了破伤风菌，得上抽风病。

小豬受凉：母猪产仔时若猪圈太凉或是潮湿，或是垫草太少，猪臥下就易受凉，小豬爬下，不愿站起来，甚至腿不好使，可以放在热炕头上用被盖着，把嘴露出来，等鼻子出汗后，小豬就欢活了，等汗落后，再讓它出去，把猪圈弄得干燥暖和些就好了。

(陈、張、邱整理)

## 秕 糊 变 糟 喂 猪

辽源市白泉人民公社光明管理区养猪場利用秕糊变糟后喂猪效果很好。將变糟及喂养經驗介紹如下：

高粱壳变糟的方法有两种：

1. 缸內变糟法：將高粱壳放在鍋里煮。經過半天的時間，取出后趁热放在缸里。裝一半煮好的，裝一半干的。然后均匀攪拌，用麻袋等盖严，放在屋子里，很快就能自行发酵。发酵后質量很好，且有酒糟的芳香气味。

2. 窖藏变糟法：挖一圓窖或長方形窖，將高

粱壳用水拌好（掺水程度以用手握一把稍滴水时为适），装在窖里，装一层踩一层，一直装成馒头型，上面盖上1尺厚的土。几天后沉下去后再繼續添土。經過半年以后即变糟，且气味芳香。猪特别爱吃。

对谷秕子先經過3—4天以上炕烘或鍋炒后，再用磨或碾子粉碎、过篩、煮后喂用效果良好。

該养猪場利用以上方法处理后的秕糊与少量南瓜掺在一起，同时放在鍋里經過煮熟喂猪，能大大地提高秕糊的适口性和利用率。