

完了后不能馬上就喂飼料，需要休息一些時間。

小豬的豬圈要常常保持干燥，鋪草要干，防止潮湿身上長癩。

## 选 种

选猪种要月月留，年年选，有好的就选。选种要选身腰長的，腿高腿粗的，尾巴尖扁扁的，咀巴短的，两个睾丸要一样大，一大一小或一上一下都不能做种。腿高腿粗的能長大猪。咀巴短，往上翘，鼻孔粗，不闷气，就不易得病，尖咀猪最不好。

母猪也要咀短粗，奶头多，大母猪爱崽子，性好的，不爱压死仔猪，善于扶养仔猪的母猪进圈就呼呼地，把小猪圈在一边，先跪下两只前腿，试探着爬下，这样就不会压死一个小猪。母猪乳房发达，奶头整齐的都應該留做母猪，不善于扶养猪羔的，奶头象油瓶样的，又粗，又扁，奶头数又少都不要留作种猪。

## 防疫卫生和疾病治疗

要想把猪大发展起来，除了以上說的以外，防疫更重要，过去常患猪瘟，所以应特别注意預防打針。每年兽医进行防疫时，我亲自看着，一头也不丢掉。去年我也学会了打針了。自己干更可靠。小豬离奶后应馬上注射防疫針。平常在每次喂完后，用清水把槽子刷干净，盖上盖子防止灰土和别的猪乱哄，带来病菌，垫草要常换，猪舍用具每月用来苏儿或小灰水消毒两次，猪圈内外人不能随便进

去。除此外，对几种猪病治疗，我也有几个土办法，介紹如下：

大腸病：猪病不吃食，鼻孔干，尾巴下垂腰弓弓着，好喝冷水，严重时猪排不出粪来。預防的办法是每月喂2—3次大黃末掺芒硝，一个猪每次2—3錢，这就能撒火通便。若严重时，排不出粪，也不吃食，就用半斤麻籽油、半斤面碱，装在玻璃杯内，把猪放在猪食槽里，四条腿朝上，两个人把住，用一根不粗的木棒把嘴撬开，瓶口从嘴角里插进去慢慢倒入口，把瓶拿出来，木棒輕輕敲几下腦門，药就嚥下了，灌完后接着再灌一瓢小米粥，加点鹽和面碱，这样一次就能灌好。

猪下痢：猪下痢主要是飼料調制不当，和飼养管理沒有跟上，可能是猪圈潮湿，或者是猪吃带有冰块的冷食，因此消化不好就下瀉，可以用“貫金片”治疗，七、八十斤的猪，每次灌1—1.5片。或将白矾燒后压碎，和貫金片一起喂下。有条件时也可以用7—8粒胡椒压碎后，混合貫金片，加点黃酒或白酒一齐灌下，效果更好。

小豬抽风：小豬七、八天容易抽风，这主要是沒实行人工接产、脐帶自己断或者是接产不卫生，贼风吹进了，感染了破伤风菌，得上抽风病。

小豬受凉：母猪产仔时若猪圈太凉或是潮湿，或是垫草太少，猪臥下就易受凉，小豬爬下，不愿站起来，甚至腿不好使，可以放在热炕头上用被盖着，把嘴露出来，等鼻子出汗后，小豬就欢活了，等汗落后，再讓它出去，把猪圈弄得干燥暖和些就好了。

(陈、張、邱整理)

## 秕 糊 变 糟 喂 猪

辽源市白泉人民公社光明管理区养猪場利用秕糊变糟后喂猪效果很好。將变糟及喂养經驗介紹如下：

高粱壳变糟的方法有两种：

1. 缸内变糟法：將高粱壳放在鍋里煮。經過半天的時間，取出后趁热放在缸里。裝一半煮好的，裝一半干的。然后均匀攪拌，用麻袋等盖严，放在屋子里，很快就能自行发酵。发酵后質量很好，且有酒糟的芳香气昧。

2. 窖藏变糟法：挖一圓窖或長方形窖，將高

粱壳用水拌好（掺水程度以用手握一把稍滴水时为适），装在窖里，装一层踩一层，一直装成馒头型，上面盖上1尺厚的土。几天后沉下去后再繼續添土。經過半年以后即变糟，且气味芳香。猪特别爱吃。

对谷秕子先經過3—4天以上炕烘或鍋炒后，再用磨或碾子粉碎、过篩、煮后喂用效果良好。

該养猪場利用以上方法处理后的秕糊与少量南瓜掺在一起，同时放在鍋里經過煮熟喂猪，能大大地提高秕糊的适口性和利用率。